

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата

ЭНТЕРОСГЕЛЬ®

Регистрационный номер: Р N 003719/01.

Торговое название препарата. Энтеросгель®.

Международное непатентованное или группировочное название.

Полиметилсилоксана полигидрат.

Химическое название.

Продукт нелинейной поликонденсации 1,1,3,3-тетрагидрокси-1,3-диметилдисилоксана полигидрат

Лекарственная форма.

Гель для приготовления суспензии для приёма внутрь.

Состав на 100 г препарата:

Полиметилсилоксана полигидрат 100 г.

Описание. Влажная масса белого цвета, состоящая из желеобразных комочков разного размера, без запаха.

Фармакотерапевтическая группа.

Энтеросорбирующее средство.

Код АТХ. А 07 В.

Фармакологические свойства. Энтеросгель® имеет пористую структуру кремнийорганической матрицы (молекулярная губка) гидрофобной природы, которая характеризуется сорбционным действием по отношению только к среднемoleкулярным токсическим метаболитам (м.м. от 70 до 1000).

Энтеросгель® обладает выраженными сорбционным и детоксикационными свойствами. В просвете желудочно-кишечного тракта препарат связывает и выводит из организма эндогенные и экзогенные токсические вещества различной природы, включая, бактерии и бактериальные токсины, антигены, пищевые аллергены, лекарственные препараты и яды, соли тяжёлых металлов, алкоголь. Препарат сорбирует также некоторые продукты обмена веществ организма, в том числе избыток билирубина, мочевины, холестерина и липидных комплексов, а также метаболиты, ответственные за развитие эндогенного токсикоза. Энтеросгель® не уменьшает всасывания витаминов и микроэлементов, способствует восстановлению нарушенной микрофлоры кишечника и не влияет на его двигательную функцию.

Фармакокинетика. Препарат не всасывается в желудочно-кишечном тракте, выводится в неизменённом виде в течение 12 часов.

Показания к применению. У взрослых и детей в качестве детоксикационного средства:

- острые и хронические интоксикации различного происхождения;
- острые отравления сильнодействующими и ядовитыми веществами, в том числе, лекарственными препаратами и алкоголем, алкалоидами, солями тяжёлых металлов и др.;
- острые кишечные инфекции любого генеза в составе комплексной терапии (токсикоинфекции, сальмонеллёз, дизентерия, диарейный синдром неинфекционного происхождения, дисбактериоз и др.);
- гнойно-септические заболевания, сопровождающиеся выраженной интоксикацией, в составе комплексной терапии;
- пищевая и лекарственная аллергия;

- гипербилирубинемия (вирусные гепатиты) и гиперазотемия (хроническая почечная недостаточность);

- с целью профилактики хронических интоксикаций работникам вредных производств (профессиональные интоксикации химическими агентами политропного действия, ксенобиотиками, инкорпорированными радионуклидами, соединениями свинца, ртути, мышьяка, нефтепродуктами, органическими растворителями, окислами азота, углерода, фторидами, солями тяжёлых металлов и др.).

Противопоказания. Индивидуальная непереносимость препарата, атония кишечника.

Беременность и лактация. Энтеросгель® не противопоказан при беременности и лактации.

Способ применения и дозы. Энтеросгель® принимают внутрь в виде водной суспензии. Для получения суспензии необходимое количество препарата тщательно растирают в 1/4 стакана воды и принимают, запивая водой, за 1-2 часа до еды или приема других лекарств. Рекомендуется готовить свежую суспензию перед каждым приемом препарата.

Дозировка для взрослых - по 1 столовой ложке (15 г) 3 раза в сутки (45 г). Детям в возрасте до 5 лет - 1 чайная ложка (5 г) 3 раза в сутки (15 г), а от 5 до 14 лет - 1 десертная ложка (10 г) 3 раза в сутки (30 г). Для профилактики хронических интоксикаций - в сутки 30 г или в 2 приёма по 15 г в течение 7-10 дней ежемесячно.

При тяжёлых интоксикациях в течение первых трех суток доза препарата может быть увеличена вдвое. Продолжительность лечения при острых отравлениях - 3-5 суток, а при хронических интоксикациях и аллергических состояниях - 2-3 недели. Повторный курс по рекомендации врача.

Побочное действие. Возможны тошнота, запор. При тяжёлой почечной и/или печёночной недостаточности возможно появление чувства отвращения к препарату.

Передозировка. Случаев передозировки не выявлено.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами. Возможно уменьшение всасывания других препаратов при одновременном приёме с Энтеросгелем®.

Особые указания. Препарат может использоваться в комплексной терапии с другими лекарственными средствами при соблюдении правила раздельного по времени приема 1-2 часа до или после приёма других лекарственных препаратов.

Форма выпуска. Гель для приготовления суспензии для приема внутрь в двойных полиэтиленовых пакетах по 45, 225, 450 г, в пакетах из прозрачного или белого полиэтилена с маркировкой, нанесённой флексографическим методом печати по 45, 225, 450 г, в полимерных банках с контролем первого вскрытия по 225, 450 г. По 1 пакету или по 1 банке вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения. При температуре не ниже 4 °С в местах, недоступных для детей. Предохранять от высыхания после вскрытия упаковки.

Беречь от замораживания.

Срок годности. 5 лет. Не использовать по окончании срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек. Без рецепта.

Производитель. ООО «ТНК СИЛМА». Россия, 399851, Липецкая обл., г. Данков, ул. Зайцева, д.8
Тел./факс (495) 223-91-00,
www.enterosgel.ru, e-mail: contact@enterosgel.ru